



**Μαστοκυττάρωση &  
Σύνδρομα Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων**  
ECNM Center of Excellence  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ"

## Προθεραπεία ασθενών με Συστηματική Μαστοκυττάρωση πριν τη χορήγηση εμβολίου έναντι της νόσου Covid-19

Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν 24, 12 και 1 ώρα πριν τον εμβολιασμό :

- Tb. Xozal 5mg
- Tb. Peptan 20mg

και μία (1) ώρα πριν τον εμβολιασμό επίσης Tb. SINGULAIR 10mg

Σε περίπτωση που λαμβάνουν σταθερή αγωγή για ρύθμιση των συμπτωμάτων των μαστοκυττάρων θα πρέπει να λαμβάνουν **μόνο μία δόση** των παραπάνω, **1 ώρα πριν** τον εμβολιασμό.

**Οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν για παρακολούθηση στον χώρο του εμβολιαστικού κέντρου για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά τον εμβολιασμό.**

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε (2105832450) με το Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης και Συνδρόμων Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων της Μονάδας Αλλεργιολογίας του Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"